

A terhesség 12. hete előtt

Korai szűrés

korai ultrahang

- ☐ A terhesség megerősítése
- ☐ Annak megállapítása, hogy egyes vagy többszörös terhességről van-e szó
- ☐ Méhen kívüli terhesség kizárása

Ezt az ultrahangvizsgálatot hüvelyen keresztül (transzvaginálisan) vagy a hasfalon keresztül (abdominálisan) végzik, és elsősorban a terhesség megerősítésére, az **egyszeres vagy többszörös terhesség tisztázására, valamint a méhen kívüli terhesség** (pl. kürtterhesség) kizárására szolgál.

A terhesség normális esetben a méhben (intrauterin) zajlik. Ritka esetekben azonban a méhen kívül is beágyazódhat, általában a petevezetékben vagy a méhnyaknál.

Többszörös terhesség esetén általában már a **korai szűrővizsgálat során megállapítható a terhesség chorionicitása (egypetējűség vagy kétpetējűség)**. Ez a további terhesgondozás szempontjából lényeges, mivel a chorionicitástól függően különböző vizsgálati időközökre lehet szükség.

Ha a szülés időpontja nem egyértelmű, a terhességet a korai szűrés során a magzatburok mérete alapján, vagy ha lehetséges, az embrió méretének (fejtető-far hosszúság, SSL) mérésével datálják, **majd meghatározzák a szülés ideiglenes időpontját**. Ezt általában a terhesség 12–14. hete között elvégzett kombinált teszt során rögzítik véglegesen.

Értékelik továbbá a szív működését, a méhlepényt és a magzatburkot.



Ha a korai szűrést túl korán végzik el, előfordulhat, hogy sem a terhesség helye, sem a chorionicitása nem állapítható meg egyértelműen. Ebben az esetben általában további ultrahang vagy laboratóriumi vizsgálat javasolt.

Szeretnék korai szűrővizsgálatot végeztetni.



Páciens név és keresztnév(nevek)

Bécs, dátum

Páciens aláírása

Doktornő aláírása

