

Gebeliğin 12. haftasından önce

Erken Tarama

Erken Ultrason

- *Gebeliğin Onayı*
- *Gebeliğin Tekil veya Çoğul olup olmadığının belirlenmesi*
- *Ektopik (dış) gebeliğin ihtimalinin ortadan kaldırılması*

Bu ultrason muayenesi vajinal yoldan (transvajinal) veya karın duvarından (karın) yapılır. Öncelikle gebeliği doğrulamak, tekil veya çoğul gebelik olasılığını belirlemek ve rahim boşluğu dışında bir gebelik (örn. dış gebelik) olasılığını elemek için kullanılır.

Gebelik, genellikle rahimde (rahim içi) lokalize olmaktadır. Ancak embriyo, nadir durumlarda, rahmin dışına (ektopik gebelik), genellikle fallop tüpüne veya rahmin serviksine de yerleşmiş olabilir.

Çoğul gebelik durumunda, erken taramanın bir parçası olan gebeliğin koryonisitesini (monozigotik veya dizigotik) belirlemek genellikle zaten mümkündür. Bu, daha ileri gebelik bakımı için önemlidir, çünkü koryonisiteye bağlı olarak farklı muayene aralıkları gerekli olabilir.

Son adet tarihi belirsizse, erken taramada amniyotik kesenin boyutu veya mümkünse embriyonun boyutu (baş-popo uzunluğu, CLS) hamileliğin tarihinin belirlenmesi amacıyla kullanılır ve geçici bir son tarih belirlenir. Bu genellikle, hamileliğin 12. ve 14. haftaları arasında Kombine Testin bir parçası olarak son aşamada düzeltilir.



Ayrıca kalp atım hızı, plasenta ve amniyon kesesi değerlendirilir. Erken tarama çok erken yapılırsa, gebeliğin lokalitesi ve koryonisitesi net olarak değerlendirilemeyebilir. Bu durumda, genellikle ek bir ultrason veya laboratuvar kontrolü önerilir.

Erken Tarama yaptırmak istiyorum.



Hastanın adı ve soyadı

Viyana, tarih

Hastanın imzası

Doktorun imzası

